

Cichorei

Naar mijn mening moet cichorei als een winterteelt gezien worden omdat:

- Cichorei neemt na 1 oktober een grotere hoeveelheid stikstof op (gemiddeld 35 kg), dan een vanggewas
- Cichorei blijft tot lang in de herfst gezond en groen en blijft stikstof opnemen
- Cichorei is door de CDM aangeduid als niet-uitspoelingsgevoelig-gewas
- Cichorei met de oogst ook daadwerkelijk stikstof afvoert
- Cichorei wordt grotendeels na 1 oktober geoogst ten behoeve van groei en kwaliteit en door de beperking van de bewaarduur

Ik vind dat suikerbieten zonder beperkende voorwaarden als winterteelt gezien moeten worden, omdat: - Suikerbieten nemen na 1 oktober nog significante hoeveelheden stikstof (20 – 25 kg) op, vergelijkbaar met een vanggewas (25 kg) - Suikerbieten zijn door de CDM aangeduid als niet-uitspoelingsgevoelig-gewas - Met de bietenoogst wordt de stikstof ook daadwerkelijk afgevoerd, terwijl bij een vanggewas de stikstof op het perceel blijft - Het overgrote deel van de suikerbieten wordt na 1 oktober geoogst om de bieten nog te laten groeien en om bewaarverliezen te voorkomen