3.4 Pluimvee, konijnen en nertsen

De technische kengetallen voor vleeskuikens en leghennen ouder dan circa 18 weken worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de deeladministraties leghennen en vleeskuikens in het Bedrijveninformatienet (BIN) van Wageningen Economic Research. Bij de bepaling van de mineralengehalten van kippenvoer voor de onderscheiden categorieën kippen zijn de bedrijven waaraan kippenvoer is geleverd, gekoppeld aan de gegevens in de Landbouwtelling. De samenstelling van het voer voor een bepaalde pluimveecategorie is gebaseerd op de gemiddelde samenstelling van het voer dat geleverd is aan bedrijven die uitsluitend de betreffende pluimveecategorie houden. Op deze manier is de samenstelling bepaald van leghennenvoer, vleeskuikenvoer en voer voor vleeskuikenouderdieren. Voor eenden, kalkoenen, nertsen en konijnen komen de voercategorieën in de overzichten van RVO overeen met de diercategorieën in de Landbouwtelling. Een nadere uitsplitsing van deze voercategorieën zoals bij varkens en kippen is dus niet nodig.
In tabel 3.4.1 is de berekening van de mineralenuitscheiding van vleeskuikens en leghennen weergegeven.

3.4.1 Mineralenuitscheiding van vleeskuikens en leghennen, 2017

	Eenheid	Vleeskuiken			Leghen ouder dan 18 weken		
Voerverbruik							
vleeskuikenvoer	kg/dier.jaar	35,1	(34,7)				
legvoer	kg/dier.jaar				42,3	(41,7)	
Vastlegging							
groei	gram/dier.dag	56,6	(56,5)		0,5	(0,4)	
vlees	kg/dier.jaar	20,7	(20,6)		0,2	(0,2)	
eieren per hen vanaf 20 weken	kg/dier.jaar				19,0	(19,2)	
eieren per hen vanaf 18 weken	kg/dier.jaar				18,2	(18,4)	
		stikstof (N)	**fosfor (P)**	**kalium (K)**	**stikstof (N)**	**fosfor (P)**	**kalium (K)**
Mineralengehalten dierlijke productie							
vlees	g/kg	28,3	4,4	2,4	28,0	6,2	2,1
eieren	g/kg				18,5	1,7	1,2
Mineralenbalans							
opname met voer	kg/dier.jaar	0,987	0,148	0,244	1,106	0,214	0,298
vastlegging in vlees	kg/dier.jaar	0,585	0,092	0,050	0,005	0,001	0,000
vastlegging in eieren	kg/dier.jaar				0,336	0,031	0,022
uitscheiding	kg/dier.jaar	0,40	0,06	0,19	0,76	0,18	0,28
		stikstof (N)	**fosfaat (P_2O_5)[1)]**	**kali (K_2O)[2)]**	**stikstof (N)**	**fosfaat (P_2O_5)[1)]**	**kali (K_2O)[2)]**
Uitscheiding als N, P_2O_5 en K_2O	kg/dier.jaar	0,40	0,13	0,23	0,76	0,42	0,33
Idem, in 2016	kg/dier.jaar	0,43	0,14	0,23	0,75	0,41	0,33

[1)] De omrekenfactor voor P in P_2O_5 is 2,29.
[2)] De omrekenfactor voor K in K_2O is 47/39.
N.B. Tussen haakjes staan de hoeveelheden voor de berekening van 2016.