

Beste,

Al voor decennia 's lang heb ik me ingezet voor biotoop verbetering en behoudt van mooi natuur, dit niet alleen, dit doen we met meerdere jagers en betrokkenen.

Niet alleen als individuele jager maar ook als combinatie(s) zijn we jaarlijks vele dagen kwijt aan het verbeteren van de biotoop van allerhande zoogdieren en vogels. Door deze verbeteringen en de bestrijding van exoten en predatoren proberen we de fauna in ons jachtveld positief te bevorderen.

Veel van ons zijn actief bezig met het plaatsten van broedkorven om zo de stand van de wilde eend te bevorderen.

Ook bij de afhandeling van valwild wordt vaak een beroep gedaan op ons, we rukken hiervoor meermaals per maand uit om allerhande verkeerslachtoffers op te ruimen. Het kan dan gaan om reeën, vossen of bevers maar ook de kleine diersoorten laten we niet links liggen.

De administratie van dit alles vraagt ook een boel tijd en energie van ons, acties om schade te voorkomen, valwild en daarnaast afschot.

Alles wordt geregistreerd en bijgehouden, ook waarnemingen kunnen we sinds kort kwijt in FRS (Fauna Registratie Systeem) maar dit is iets wat we ook al jaren bijhouden. Gemiddeld zijn we bijna dagelijks in ons veld te vinden om in de gaten te houden wat er allemaal speelt en leeft, we kunnen zo vertellen wat er in de velden ophoudt.

Even iets meer aandacht op de haas en het konijn.

De haas komt in ons jachtgebied algemeen en talrijk voor in gras- en akkerland. Hij heeft een voorkeur voor kleinschalige landbouwgebieden met afwisselende gewassen. Hazen leven solitair en zijn sterk plaatsgebonden. Hun leefgebieden overlappen elkaar sterk, waardoor vooral bij het foerageren groepsvorming optreedt. De hoogte van de hazenstand kan van jaar tot jaar sterk verschillen, vooral onder invloed van het weer. Natte omstandigheden bevorderen het uitbreken van parasitaire infecties. De kleigronden daar zien we dat de stand min of meer stabiel is.

Hazen kunnen schade veroorzaken op akkerlanden, vooral aan granen, suikerbieten, wortelen, pionrozen en peulvruchten. Deze schade zal binnen de perken blijven, omdat de haas in het jachtseizoen goed gereguleerd wordt. Schade van hazen in percelen met fruitbomen, boomkwekerijen en vollegrondsgroenten kan oplopen, maar is goed te voorkomen met een deugdelijk hazenkerend raster.

Het konijn komt algemeen en talrijk voor, vooral op zandgronden waar dekking is en korte grazige vegetaties. Konijnen bewonen het gehele jaar hetzelfde gebied. Het leefgebied strekt zich uit tot een straal van 50-150 meter rond de holen en verschillende leefgebieden kunnen elkaar overlappen. De konijnenstand wordt regelmatig geplaagd door virusziekten (myxomatose en viraal haemorrhagisch syndroom). Gedurende het jaar kunnen populaties konijnen erg fluctueren. Konijnen foerageren voornamelijk op graslanden maar eten ook granen/mais,

suikerbieten en wortelen. Schade aan deze gewassen zal binnen de perken blijven. Schade van konijnen in percelen met fruitbomen, boomkwekerijen en vollegrondsgroenten kan oplopen, maar is goed te voorkomen met een deugdelijk konijnenkerend raster. Tevens moeten we ernstig rekening houden met graafschade in dijken wanneer er te veel konijnen zijn, bij niet zorgvuldige bestrijding van konijnen ter preventie van schade zou dit een humanitaire probleem kunnen worden.

Een ding staat voorop: jagers willen niet alleen jagen, jagers willen blijven jagen! En dus zal een jager er veel aan willen doen om dit te bewerkstelligen, het jaarrond bejagen wij de predatoren zoals kraaien, vossen en ratten. Een jager probeert de biotoop zo aantrekkelijk mogelijk te maken met de beschikbare middelen en zal proberen om de grondgebruiker te vriend te houden met de hoop dat hij niet alles in één keer afmaait als de eerste snede eraf kan.

Zoals gezegd is een jager vele uren per week bezig met verbeteren van zijn jachtveld om mogelijk 1 of 2 keer per jaar een mooie jachtdag te hebben en daarbij wat wild te bemachtigen. Door vele worden deze jachtdagen gezien als beloning voor al het werk wat het jaarrond gedaan is. Op het moment dat de jacht niet geopend zal worden zal bij vele de motivatie om deze inspanning te doen wegzakken met alle gevolgen van dien!

Ik kan dan ook niet begrijpen waarom de jacht niet geopend zou worden op het konijn en het haas, in mijn ogen gaat het GOED met deze diersoorten. Het demotiveren van de jager(s) zou op de lange termijn in mijn ogen een negatief effect hebben op de stand van het konijn, de haas, de weidevogels en andere inheemse soorten van Nederland.

De reden waarom ik kan aangeven dat het goed gaat met de diersoorten heeft te maken met buiten ons aanwezigheid in de velden dat we vandaag de dag ook een bevestiging hebben gekregen door het gebruik maken van warmtebeeldcamera's dat er veel diersoorten zijn. Door deze nieuwe tool te gebruiken ontgaat er geen enkel diersoort meer.

Met hartelijke groeten,

Jeroen Dooijenburgh