

Al jarenlang wordt er door onze WBE elk jaar op dezelfde wijze een voorjaarstelling wild en faunasoorten doorgevoerd. Dit op een zeer accurate wijze en nog zonder warmtebeeld. Deze resultaten staan al jarenlang in FRS maar bij besluitvorming wordt dit als niet voldoende ter zijde geschoven. Een telling, als bijvangst overdag !! , door vogelaars, wordt als leidend gebruikt bij de vaststelling van het voorkomen van een soort in een omgeving.

De laatste jaren zijn de aantallen getelde hazen alleen maar omhoog gegaan, het gaat zeer goed met de haas. De laatste telling is meer dan 100% hoger dan eerdere jaren. Tellingen met warmtebeeld vallen nog veel hoger uit. Bijna elke dag zie ik wel doodgereden haas liggen aan de straat, een goede meetlat voor de aantallen hazen die er voorkomen. Verder zie je in de "rammeltijd" regelmatig 10 hazen of meer bij elkaar lopen.

Wat het aantal konijnen betreft is afhankelijk van de ziekten. Voorjaar/zomer zijn er vaak veel. Herfst/winter is het aantal weer afgenomen door ziekten. Er blijven er voldoende over om ze te bejagen.

Resumerend: hazenstand neemt toe en konijnenstand blijft gelijk.

Laat tellingen over aan mensen die er verstand van hebben er zich er voor willen inzetten. De juiste aantallen zullen openbaar worden, gebaseerd op jaren lange tellingen en deskundigheid. Als uitgangspunt van de ontwikkeling 1950 nemen wat is daar de logica van ? dat is 70 jaar geleden de hele wereld is veranderd en Nederland al helemaal.

WBE bestuurder.